

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

REC'D 26 AUG 2004

WIPO PCT

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 103 36 612.1

Anmeldetag: 08. August 2003

Anmelder/Inhaber: BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen/DE

Bezeichnung: Verwendung von Acylcyclohexandion-Derivaten
zusammen mit Ethephon zur Behandlung von
Kernobst

IPC: A 01 N, A 01 P

Best Available Copy

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 08. Juli 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Schäfer

Verwendung von Acylcyclohexandion-Derivaten zusammen mit Ethephon zur Behandlung von Kernobst

Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Acylcyclohexandion-Derivaten zusammen mit Ethephon zur Behandlung von Kernobst.


10

Das Reduzieren eines übermäßigen Triebwachstums auf chemischem Wege, d. h. der Einsatz von Wachstumsregulatoren, ist bei Obst-Dauerkulturen erwünscht, da Schnittkosten gespart und Pflanzenschutzmaßnahmen erleichtert werden können und außerdem die Belichtung im Inneren des Bestands verbessert werden kann.

15

Sowohl Acylcyclohexandion-Derivate als auch Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure) sind bekannte Wachstumsregulatoren. So beschreiben die EP-A-123001 als auch die EP-A-126713 die Verwendung von Acylcyclohexandionverbindungen der allgemeinen Formel

20



worin

25

R für Wasserstoff, Alkyl, Alkylthioalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht und

R' für Alkyl, gegebenenfalls substituiertes Benzyl, Phenethyl, Phenoxyethyl, 2-Thienylethyl, Alkoxyethyl oder Alkylthioethyl steht, oder Salzen davon als Wachstumsregulatoren.

30

L.J. Edgerton und W.J. Greenhalgh beschreiben in J. Amer. Soc. Hort. Sci. 94, S. 11-14 (1969) die wachstumsregulierende Wirkung von Ethephon auf Äpfel.

35

Als nachteilig bei der Verwendung von Acylcyclohexandion-Derivaten zur Wachstumsregulierung hat sich erwiesen, dass bei bestimmten Pflanzen die Blütenbildung im Jahr nach der Behandlung und folglich auch die Fruchtbildung deutlich reduziert ist. So berichten D. Sugar, D.C. Elfving und E.A. Mielke in Acta Hort. 596, S. 757-760 (2002), dass die Behandlung von Birnbäumen mit Prohexadion-Calcium zu einer Verringerung der Folgeblüte führt. Versuche der Anmelderin haben diese Ergebnisse bestätigt und gezeigt, dass Wachstumsregulatoren auf Basis von Acylcyclohexandionen, insbesondere Prohexadion-Calcium und besonders stark Trinexapac bzw. Trinexapac-Ethyl, bei Kernobst und speziell bei Apfel und Birne zu einer deutlichen Reduktion der Blütenbil-

40

ung im Jahr nach der Behandlung führt. Im Extremfall kann die Blütenbildung im Jahr nach der Behandlung sogar vollständig ausbleiben.


Die Behandlung führt nicht nur zu einer Reduktion der Folgeblüte und häufig damit verbunden zur Ertragsminderung im betreffenden Jahr, sondern kann auch Auslöser einer Alternanz sein. Alternanz bedeutet, dass auf ein Jahr mit zu geringen Erträgen ein Jahr mit zu hohen Erträgen meist niedriger Qualität folgt. Bei Obst-Dauerkulturen, wie Kernobst (Apfel, Birne, Quitte), Steinobst (Süß- und Sauerkirsche, Pflaume, Zwetschge, Pfirsich, Nektarine, Aprikose, Mandel), Beerenobst (Stachelbeere, Johannisbeere, Himbeere, Brombeere), Schalenobst (Walnuss, Haselnuss, Pekannuss, Pistazie), Zitrus (Orange, Pampelmuse, Mandarine, Zitrone), Weinrebe, Feige, Kakipflaume, Kiwifrucht, Avocado, Mango, Litschi, Dattel und auch bei Kaffee und Kakao ist jedoch ein auf Dauer konstanter Ertrag ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, so dass Schwankungen in Quantität und Qualität der Erzeugnisse möglichst vermieden werden müssen. Folglich ist eine durch chemische Wachstumsregulatoren induzierte Alternanz wirtschaftlich nicht hinnehmbar.

D.C. Elfving, G.A. Lang und D.B. Visser beschreiben in HortScience 38 (2), S. 293-298 (2003), dass bei bestimmten Kirscharten die Behandlung der Bäume mit einer Kombination aus Prohexadion-Calcium und Ethephon zu einer erhöhten Blütendichte und gleichzeitig zu einer vegetativen Wachstumsverringering führt. Eine Blütenreduktion im Folgejahr nach der Behandlung mit Prohexadion-Calcium alleine wird hingegen nicht berichtet.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, eine wachstumsregulierende Zusammensetzung zur Behandlung von Kernobst bereitzustellen, welche das vegetative Wachstum verringert und gleichzeitig die Blütenbildung nach der Behandlung nicht wesentlich reduziert.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass Ethephon die Reduktion der Blütenbildung, die bei Kernobst nach der Behandlung mit bestimmten Acylcyclohexandion-Derivaten auftritt, verhindert. Die Aufgabe wurde daher durch die gemeinsame Verwendung von Acylcyclohexandion-Derivaten und Ethephon gelöst.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist folglich die Verwendung wenigstens einer Verbindung der Formel I



worin


R¹ für H oder C₁-C₁₀-Alkyl steht und
R² für C₁-C₁₀-Alkyl oder C₃-C₁₀-Cycloalkyl steht,

5

oder Salzen davon

zusammen mit 2-Chlorethylphosphonsäure (Ethephon) der Formel II

10



15

zur Behandlung von Kernobst, insbesondere zur Verhinderung der durch die Behandlung mit Acyclcyclohexandion-Derivaten der Formel I in Kernobst beobachteten Blütenreduktion und einer durch die Behandlung eventuell induzierten Alternanz.

20

Unter Kernobst versteht man im Rahmen der vorliegenden Erfindung Apfel, Birne oder Quitte, insbesondere Apfel oder Birne. Mit der Bezeichnung Kernobst bzw. spezifiziert als Apfel, Birne oder Quitte sind die Obstbäume oder Pflanzenteile davon, hingegen nicht das Obst in geernteter Form gemeint.

25

Die Behandlung erfolgt, um die Blütenbildung bei Kernobst zu verbessern. Die Verbesserung der Blütenbildung umfasst insbesondere eine vollständige oder zumindest teilweise Verhinderung derjenigen Blütenverringern, die auf die Behandlung mit Acyclcyclohexandion-Derivaten zurückzuführen ist. Gleichzeitig soll die Behandlung selbstverständlich zu einer Verringerung des vegetativen Wachstums führen. „Ganz oder teilweise verhinderte Blütenverringern“ bedeutet, dass erfindungsgemäß behandelte Pflanzen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in der gesamten saisonalen Blühzeit vorzugsweise wenigstens 40 %, besonders bevorzugt wenigstens 60 % und insbesondere wenigstens 80 % der Anzahl an Blüten oder alternativ der Anzahl der Blütenstände von unbehandelten, d.h. nicht mit Wachstumsregulatoren behandelten, aber ansonsten gleichen Bedingungen ausgesetzten Kontrollpflanzen aufweisen. Der Blütenstand (Infloreszenz) ist Teil des Sprosssystems vieler Samenpflanzen, wie Kernobst, welcher in der Regel mehrere Blüten trägt und später eine oder mehrere Früchte ergibt.

30


35

40

Eine teilweise oder vollständige Verhinderung der Blütenverringern ist auch dann gegeben, wenn die erfindungsgemäß behandelten Pflanzen signifikant mehr Blüten oder alternativ Blütenstände zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in der gesamten saisonalen Blühzeit aufweisen als Pflanzen, die ansonsten gleichen Bedingungen ausgesetzt waren, die jedoch ausschließlich mit Acyclcyclohexandion-Derivaten, d. h. ohne Ethephon, behandelt wurden.

Acylcyclohexandionverbindungen der Formel I sind aus der EP-A 0 123 001 und aus der EP-A 126 713 bekannt.

Die Verbindungen der Formel I können sowohl in der Trionform (Tri keto-Form) I.a als auch in den tautomeren Keto-Enol-Formen I.b bzw. I.c vorliegen:




In den Verbindungen der Formel I steht R^1 vorzugsweise für H oder C_1 - C_4 -Alkyl.

R^2 steht vorzugsweise für C_1 - C_4 -Alkyl oder C_3 - C_6 -Cycloalkyl und insbesondere für Ethyl oder Cyclopropyl.

In der Definition der Reste R^1 und R^2 steht C_1 - C_{10} -Alkyl für einen linearen oder verzweigten Alkylrest, wie Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sec-Butyl, Isobutyl, tert-Butyl, Pentyl, Neopentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl, Nonyl oder Decyl. C_1 - C_4 -Alkyl steht beispielsweise für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sec-Butyl, Isobutyl oder tert-Butyl. Vorzugsweise ist der Alkylrest linear.

In der Definition von R^2 steht C_3 - C_{10} -Cycloalkyl beispielsweise für Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl, Cyclodecyl oder Decalin. C_3 - C_6 -Cycloalkyl steht beispielsweise für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl.

Bei den Salzen der Acylcyclohexandionverbindungen I mit $R^1 \neq H$ handelt es sich um die Salze von Monoanionen, während es sich im Falle von $R^1 = H$ sowohl um die Salze der Mono- als auch der Dianionen dieser Verbindungen handeln kann. Die Monoanionen können sowohl als Carboxylatanionen I.d als auch als Enolatanionen I.e bzw. I.f vorliegen:



Im Dianion liegen entsprechend die Carboxylat- und die Enolat-Gruppen nebeneinander vor.

5

Bevorzugte Kationen in den Salzen der Verbindungen der Formel I sind die Ionen der Alkalimetalle, vorzugsweise des Lithiums, Natriums und Kaliums, der Erdalkalimetalle, vorzugsweise des Calciums und Magnesiums, und der Übergangsmetalle, vorzugsweise des Mangans, Kupfers, Zinks und Eisens, weiterhin Ammonium (NH_4^+) und substituiertes Ammonium, worin ein bis vier Wasserstoffatome durch C_1 - C_4 -Alkyl, Hydroxy- C_1 - C_4 -alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Hydroxy- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Phenyl oder Benzyl ersetzt sind, vorzugsweise Ammonium, Methylammonium, Isopropylammonium, Dimethylammonium, Diisopropylammonium, Trimethylammonium, Tetramethylammonium, Tetraethylammonium, Tetrabutylammonium, 2-Hydroxyethylammonium, 2-(2-Hydroxyeth-1-oxy)eth-1-ylammonium, Di(2-hydroxyeth-1-yl)ammonium, Benzyltrimethylammonium, Benzyltriethylammonium, des weiteren Phosphoniumionen, Sulfoniumionen, vorzugsweise Tri(C_1 - C_4 -alkyl)sulfonium wie Trimethylsulfonium und Sulfoxoniumionen, vorzugsweise Tri(C_1 - C_4 -alkyl)sulfoxonium. Bevorzugte Kationen sind außerdem Chlormequat [(2-Chlorethyl)trimethylammonium], Mepiquat (N,N-Dimethylpiperidinium) und N,N-Dimethylmorpholinium. Besonders bevorzugte Kationen sind die Alkalimetallkationen, die Erdalkalimetallkationen und das Ammoniumkation (NH_4^+). Insbesondere handelt es sich um das Calciumsalz.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezieht sich die Bezeichnung "Verbindungen der Formel I" bzw. „Acylcyclohexandion der Formel I“ sowohl auf die neutralen Verbindungen I als auch auf deren Salze.

Besonders bevorzugt erfindungsgemäß verwendete Verbindungen I sind Prohexadion ($\text{R}^1 = \text{H}$, $\text{R}^2 = \text{Ethyl}$), Prohexadion-Calcium (Calcium-Salz von Prohexadion), Trinexapac ($\text{R}^1 = \text{H}$, $\text{R}^2 = \text{Cyclopropyl}$) und Trinexapac-Ethyl ($\text{R}^1 = \text{Ethyl}$, $\text{R}^2 = \text{Cyclopropyl}$).

Die Behandlung von Kernobst erfolgt vorzugsweise so, dass der Kernobst-Baum bzw. Pflanzenteile davon mit wenigstens einer Acylcyclohexandion-Verbindung I und Ethephon in Kontakt gebracht werden. Die Verbindungen der Formel I und Ethephon können im Gemisch oder getrennt appliziert werden. Bei der getrennten Anwendung kann die Applikation der einzelnen Wirksubstanzen gleichzeitig oder nacheinander erfolgen, wobei sie bei der sukzessiven Applikation vorzugsweise in einem zeitlichen Abstand von wenigen Stunden bis mehreren Wochen erfolgt.

Die Verbindungen I und Ethephon werden in einem Gewichtsverhältnis von vorzugsweise 10:1 bis 1:5, besonders bevorzugt von 5:1 bis 1:3, insbesondere von 3:1 bis 1:2, eingesetzt.

Die Verbindungen der Formel I bzw. ihre Salze werden pro Saison vorzugsweise in einer Aufwandmenge von 25 bis 1.500 g/ha, besonders bevorzugt von 50 bis 1.000 g/ha eingesetzt. Prohexadion-Calcium wird insbesondere in einer Aufwandmenge von 100 bis 500 g/ha pro Saison eingesetzt. Trinexapac-Ethyl wird pro Saison in einer Aufwandmenge von insbesondere 200 bis 800 g/ha eingesetzt. Ethephon wird vorzugs-

weise in einer Aufwandmenge von 25 bis 1.500 g/ha, besonders bevorzugt von 50 bis 750 g/ha und insbesondere von 100 bis 500 g/ha pro Saison eingesetzt.

- 5 Pro Saison werden die Wirksubstanzen vorzugsweise 1 bis 5 mal, besonders bevorzugt 1 bis 4 mal und insbesondere 2 bis 3 mal appliziert.

- 10 Es ist möglich, bei nur einem Teil der Applikationen die Verbindung der Formel I zusammen mit Ethephon einzusetzen und bei den restlichen Applikationen nur eine der Wirksubstanzen, insbesondere die Verbindung I, zu verwenden. Vorzugsweise verwendet man bei wenigstens der Hälfte der Applikationen pro Saison, besonders bevorzugt bei der Hälfte der Applikationen pro Saison und insbesondere bei wenigstens einer Applikation sowohl Verbindung I als auch Ethephon.

- 15 Die Anwendungstermine, die Anzahl der Applikationen und die speziell eingesetzten Aufwandmengen hängen dabei von der jeweiligen Obstkultur und von weiteren Parametern, wie Obstart und -sorte, Unterlage, Alter, Witterungsverlauf, Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen, ab und müssen im Einzelfall vom Fachmann festgelegt werden.

- 20 Vorzugsweise erfolgt die Applikation auf der nördlichen Erdhalbkugel im Frühjahr bis in den Frühsommer (ca. Anfang März bis Ende Juni) und auf der südlichen Hemisphäre entsprechend von Anfang September bis Ende Dezember.

- 25 Die Verbindungen der Formel I, Ethephon bzw. ihr Gemisch werden typischerweise als Formulierungen eingesetzt, wie sie im Bereich des Pflanzenschutzes üblich sind.

- 30 Sie können beispielsweise in Form von konzentrierten Lösungen, Suspensionen oder Emulsionen mit Wasser verdünnt werden und durch Versprühen angewendet werden. Die Anwendungsformen richten sich nach der Kernobstart und -sorte bzw. dem Pflanzenteil, auf den appliziert werden soll; sie sollten in jedem Fall eine möglichst feine Verteilung der Wirk- und Hilfsstoffe erlauben.

- 35 Die Formulierungen können neben den Verbindungen der Formel I und/oder Ethephon für die Formulierung von Pflanzenschutzmitteln übliche Formulierungshilfsstoffe, z. B. inerte Hilfsstoffe und/oder oberflächenaktive Substanzen, wie Emulgatoren, Dispergiermittel, Netzmittel und dergleichen, enthalten.

- 40 Als oberflächenaktive Stoffe kommen die Alkali-, Erdalkali-, Ammoniumsalze von aromatischen Sulfonsäuren, z.B. Lignin-, Phenol-, Naphthalin- und Dibutyl-naphthalinsulfonsäure, sowie von Fettsäuren, Alkyl- und Alkylarylsulfonaten, Alkyl-, Laurylether- und Fettalkoholsulfaten, sowie Salze sulfatierter Hexa-, Hepta- und Octadecanolen sowie von Fettalkoholglykoether, Kondensationsprodukte von sulfoniertem Naphthalin und seiner Derivate mit Formaldehyd, Kondensationsprodukte des Naphthalins bzw. der Naphthalinsulfonsäuren mit Phenol und Formaldehyd, Polyoxyethylenoctylphenoether,

ethoxyliertes Isooctyl-, Octyl- oder Nonylphenol, Alkylphenyl-, Tributylphenylpolyglyko-
lether, Alkylarylpolyetheralkohole, Isotridecylalkohol, Fettalkoholethylenoxid-
Kondensate, ethoxyliertes Rizinusöl, Polyoxyethylen- oder Polyoxypropylenalkylether,
Laurylalkoholpolyglykoetheracetat, Sorbitester, Lignin-Sulfitablaugen, Methylcellulose
5 oder Siloxane in Betracht. Geeignete Siloxane sind beispielsweise Polyetherpoly-
methyilsiloxan-Copolymere, die auch als "Spreader" oder "Penetratoren" bezeichnet
werden.

Als inerte Formulierungshilfsstoffe kommen im Wesentlichen in Betracht:

10 Mineralölfractionen von mittlerem bis hohem Siedepunkt wie Kerosin und Dieselöl, fer-
ner Kohlenteeröle sowie Öle pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, aliphatische, cyc-
lische und aromatische Kohlenwasserstoffe, z.B. Paraffine, Tetrahydronaphthalin, alky-
lierte Naphthaline und deren Derivate, alkylierte Benzole und deren Derivate, Alkohole
wie Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol und Cyclohexanol, Ketone wie Cyclohexa-
15 non, stark polare Lösungsmittel, z.B. Amine wie N-Methylpyrrolidon und Wasser.

Wässrige Anwendungsformen der Verbindungen I, von Ethephon bzw. ihres Gemischs
können aus Lagerformulierungen, wie Emulsionskonzentraten, Suspensionen, Pasten,
netzbaren Pulvern oder wasserdispergierbaren Granulaten, durch Zusatz von Wasser
20 bereitet werden. Zur Herstellung von Emulsionen, Pasten oder Öldispersionen können
die Verbindungen der Formel I bzw. Ethephon bzw. ihr Gemisch, als solche oder in
einem Öl oder Lösungsmittel gelöst und mittels Netz-, Haft-, Dispergier- oder Emul-
giermittel in Wasser homogenisiert werden. Es versteht sich von selbst, dass die An-
wendungsformen die in den Lagerformulierungen verwendeten Hilfsstoffe enthalten.

25 In einer bevorzugten Ausführungsform verwendet man die Verbindungen der Formel I,
Ethephon bzw. ihr Gemisch in Form einer wässrigen Spritzbrühe. Diese enthält die
Verbindungen der Formel I bzw. Ethephon in einer Menge von vorzugsweise jeweils 25
bis 500 ppm. Werden die Verbindungen der Formel I und Ethephon als Gemisch ein-
30 gesetzt, so enthält die Spritzbrühe die Wirksubstanzen in einer Gesamtmenge von vor-
zugsweise 50 bis 1000 ppm.

Die erfindungsgemäß verwendete Wirkstoffkombination aus Acylcyclohexandionen I
und Ethephon ist für eine Applikation bei allen der vorstehend genannten Kernobstar-
35 ten, aber auch bei davon verschiedenen Pflanzenarten anwendbar. Sie kann in Ab-
hängigkeit vom Pflanzenteil, auf den appliziert werden soll, mit an sich bekannten und
in der landwirtschaftlichen Praxis üblichen Geräten appliziert werden, wobei die Appli-
kation in Form einer wässrigen Spritzlösung oder Spritzbrühe bevorzugt ist.

40 Die Applikation erfolgt vorzugsweise durch Spritzen bis zur Tropfnässe. Dabei wird
entweder auf den gesamten oberirdischen Pflanzenteil oder aber nur auf einzelne
Pflanzenteile, wie Blüten, Blätter oder einzelne Triebe, appliziert. Die Wahl der einzel-
nen Pflanzenteile, auf die appliziert werden soll, hängt von der Pflanzenart und ihrem
Entwicklungsstadium ab. Bevorzugt wird auf den gesamten oberirdischen Pflanzenteil

appliziert.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Behandlung von Kernobst, dadurch gekennzeichnet, dass man wenigstens eine Verbindung der Formel I und 2-Chlõrethylphosphonsäure (Ethephon) im Gemisch oder getrennt, gleichzeitig oder nacheinander in Form einer wässrigen Spritzbrühe auf Kernobst-Pflanzen oder -Pflanzenteile aufbringt.

Vorzugsweise wird das Verfahren zur Verbesserung der Blütenbildung eingesetzt.

Die vorstehend gemachten Ausführungen bezüglich der Verbindungen der Formel I und Ethephon, der wässrigen Zusammensetzung sowie der Applikation gelten hier entsprechend.

Durch die erfindungsgemäße Verwendung von Acylcyclohexandion-Verbindungen I zusammen mit Ethephon wird das Blühverhalten von Kernobst-Dauerkulturen in Jahr nach der Behandlung deutlich verbessert. Insbesondere wird die auf die Behandlung mit bestimmten Acylcyclohexandion-Derivaten zurückzuführende Verringerung der Blütenbildung im Wesentlichen verhindert. Gleichzeitig erfolgt bei den behandelten Pflanzen die gewünschte Wachstumsregulierung.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung veranschaulichen, ohne sie jedoch einzuschränken.

Beispiele:

1. Blühverhalten bei Birne nach der Behandlung mit Prohexadion-Calcium und Ethephon

12 Jahre alte Birnbäume der Sorte "Conference" auf Unterlage BA wurden an zwei unterschiedlichen Standorten zum einen mit Prohexadion-Calcium alleine und zum anderen mit einer Kombination aus Prohexadion-Calcium und Ethephon behandelt. Hierfür wurden jeweils 4 Gruppen von 5 Bäumen, die in einer Obstanlage gleichmäßig verteilt waren, mit einer wirkstoffhaltigen Spritzbrühe bis zur Tropfnässe besprüht (ca. 1000 l/ha). Am ersten Standort wurden drei Applikationen im Abstand von ungefähr einem Monat vorgenommen. Am zweiten Standort wurde Prohexadion-Calcium bei einem Teil der Baumgruppen viermal und bei einem davon verschiedenen Teil dreimal appliziert, wobei das Applikationsintervall etwa je zwei Wochen betrug. Die Kombination aus Prohexadion-Calcium und Ethephon wurde zweimal appliziert, wobei vor und nach der kombinierten Applikation jeweils eine Applikation mit Prohexadion-Calcium alleine erfolgte. Etwa ein Jahr nach der ersten Applikation wurde die Anzahl der Blütenstände von unbehandelten Bäumen, von solchen, die ausschließlich mit Prohexadion-Calcium behandelt worden waren und von Bäumen, die mit einer Kombination aus

Prohexadion-Calcium und Ethephon behandelt worden waren, gezählt und miteinander verglichen. Die Ergebnisse sind in nachfolgenden Tabellen 1 und 2 aufgeführt.

5 Tabelle 1: Standort 1

Behandlung	Applikationszeitpunkte 2002 und Aufwandmengen an aktiver Substanz [g/ha]			Gesamtdosis [g/ha]	Blüte im Folgejahr [Anzahl der Blütenstände/Baum] April 2003
	15. April	14. Mai	16. Juni		
Unbehandelt	-	-	-	-	183
ProCa*	150	150	150	450	137
ProCa* + Ethephon	150 120	150 120	150 120	450 360	185

10 Tabelle 2: Standort 2


Behandlung	Applikationszeitpunkte 2002 und Aufwandmengen an aktiver Substanz [g/ha]				Gesamtdosis [g/ha]	Blüte im Folgejahr [Anzahl der Blütenstände/Baum] April 2003
	12. April	03. Mai	15. Mai	30. Mai		
Unbehandelt	-	-	-	-	-	250
ProCa*	120	87	87	95	389	157
ProCa*	120	87	87	-	294	152
ProCa* + Ethephon	120 -	110 395	92 315	95 -	417 710	217

* Prohexadion-Calcium

15 Wie die obigen Versuchsergebnisse zeigen, führt die Anwendung von Prohexadion-Calcium zu einer verringerten Blütenbildung im Folgejahr der Behandlung. Wird hingegen Prohexadion-Calcium in Kombination mit Ethephon appliziert, so bleibt diese Blütenreduktion aus oder wird deutlich abgemildert.

Patentansprüche

1. Verwendung wenigstens einer Verbindung der Formel I



10 worin

R¹ für H oder C₁-C₁₀-Alkyl steht und

R² für C₁-C₁₀-Alkyl oder C₃-C₁₀-Cycloalkyl steht,

15 oder Salzen davon zusammen mit 2-Chlorethylphosphonsäure (Ethephon) zur Behandlung von Kernobst.

2. Verwendung nach Anspruch 1 zur Verbesserung der Blütenbildung.

- 20 3. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Behandlung von Apfel oder Birne.

4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der Verbindung der Formel I R¹ für H und R² für Ethyl steht oder wobei die Verbindung der Formel I, in der R² für Ethyl steht, in Form des Calciumsalzes vorliegt.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei in der Verbindung der Formel I R¹ für Ethyl und R² für Cyclopropyl steht.

- 30 6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verbindung der Formel I und 2-Chlorethylphosphonsäure in einem Gewichtsverhältnis von 10:1 bis 1:5 eingesetzt werden.

- 35 7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verbindung der Formel I und 2-Chlorethylphosphonsäure im Gemisch in Form einer wässrigen Spritzbrühe eingesetzt werden, in welcher die Verbindung der Formel I und 2-Chlorethylphosphonsäure in einer Gesamtmenge von 50 bis 1000 ppm enthalten sind.

- 40 8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Aufwandmenge der Verbindung der Formel I und von 2-Chlorethylphosphonsäure im Bereich von jeweils 25 bis 1500 g/ha pro Saison liegt.

2

9. Verfahren zur Behandlung von Kernobst, dadurch gekennzeichnet, dass man wenigstens eine Verbindung der Formel I und 2-Chlorethylphosphonsäure im Gemisch oder getrennt, gleichzeitig oder nacheinander in Form einer wässrigen Spritzbrühe auf Kernobst-Pflanzen oder -Pflanzenteile aufbringt.

5

10. Verfahren nach Anspruch 9 zur Behandlung von Kernobst zur Verbesserung der Blütenbildung.

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Acylcyclohexandion-Derivaten zusammen mit Ethephon zur Behandlung von Kernobst.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.